



Leicht Lesen

Bitte unbedingt vor der Impfung lesen!

Aufklärung zur Zecken-Impfung

Der Impfstoff für Kinder bis zum 16. Lebensjahr heißt **FSME-IMMUN 0,25 ml.**

Die Grundimmunisierung besteht aus 3 Teilimpfungen:

- 1. Teilimpfung
- 2. Teilimpfung: 1 bis 3 Monate nach der 1. Teilimpfung
- 3. Teilimpfung: 5 bis 12 Monate nach der 2. Teilimpfung

Auffrischungsimpfungen

- 1. Auffrischungsimpfung 3 Jahre nach der 3. Teilimpfung
- bis zum 60. Lebensjahr alle 5 Jahre weitere Auffrischungsimpfungen
- ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre weitere Auffrischungsimpfungen

FSME, Früh-Sommer-Meningo-Enzephalitis

Diese Hirnhautentzündung kann man von einem Zeckenstich bekommen, wenn man nicht geimpft ist. Zecken sind Überträger der **Hirnhautentzündung**.

Diese Krankheit kommt in ganz Österreich und in weiten Teilen von Europa und Asien vor.

Es gibt fast überall Zecken, die diese Krankheit übertragen:

auf Bäumen, im Gras, im Gebüsch, im Laub und immer öfter auch in den Bergen.

Ungefähr 5 von 100 Zecken übertragen dieses Virus. Wenn man von so einer Zecke gestochen wird, kann es zu einer Infektion kommen.

Bei jedem Dritten treten dann Krankheitserscheinungen auf.

In seltenen Fällen ist auch eine Übertragung durch rohe frische Milch vom Bauernhof möglich.

Krankheitserscheinungen:

- nach ca. 7 bis 10 Tagen grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopfschmerzen und Erbrechen
- bei einem Teil der Betroffenen sind die grippeähnlichen Beschwerden nach einer Woche weg und dann bekommt man wieder Beschwerden wie:
 - hohes Fieber, steifer Nacken, Erbrechen
 - Benommenheit bis hin zum Koma und
 - manchmal Lähmungserscheinungen

Diese Hirnhautentzündung kann bei 1 bis 2 von 100 Personen auch zum Tod führen.

Es ist nur eine Behandlung der Beschwerden möglich, die Ursache kann nicht behandelt werden.

Folgende Dauerschäden sind möglich:

- Konzentrations- und Leistungsschwäche
- häufige Kopfschmerzen
- Epilepsie (Krampfanfälle)
- bleibende Lähmungen

Nebenwirkungen der Zeckenschutzimpfung

Jede Impfung kann Nebenwirkungen haben. Meistens sind diese Nebenwirkungen nach wenigen Tagen vorbei. Wenn nicht, sprechen sie mit ihrem Arzt.

Bei der ersten Impfung kann es zu Fieber kommen. Normalerweise geht das Fieber nach 24 Stunden wieder zurück. Falls nicht, sprechen sie mit ihrem Arzt.

Häufigkeit der Nebenwirkungen:

- Sehr häufig: Kommt bei mehr als einer von 10 geimpften Person vor.
Häufig: Kommt bei 1 bis 10 von 100 geimpften Personen vor.
Gelegentlich: Kommt bei 1 bis 10 von 1.000 geimpften Personen vor.
Selten: Kommt bei 1 bis 10 von 10.000 geimpften Personen vor.
Sehr selten: Kommt bei weniger als einer von 10.000 geimpften Personen vor.
Nicht bekannt: Es ist nicht bekannt, wie oft es vorkommt.

Sehr selten sind schwere allergische Reaktionen möglich:

- Anschwellen von Lippen, Mund und Hals mit Schluck- und Atembeschwerden
- Schwellung von Händen, Füßen und Knöcheln
- Hautausschlag
- Bewusstseinsverlust wegen Blutdruckabfall

Diese Reaktionen treten normalerweise sehr rasch nach der Impfung auf.

Wenn diese Reaktionen auftreten, müssen sie sofort zum Arzt – Notruf 144.

Sehr häufige Nebenwirkungen:

- Schmerzen an der Einstichstelle

Häufige Nebenwirkungen:

- Kopfschmerzen, Muskelschmerzen
- Schwellung, Verhärtung und Rötung an der Einstichstelle
- Übelkeit, Erbrechen, Appetitverlust
- Müdigkeit, oder Unwohlsein
- Unruhe und Schlafstörungen bei jüngeren Kindern
- Fieber

Gelegentliche Nebenwirkungen:

- Lymphknotenschwellung
- Magenschmerzen
- Gelenksschmerzen
- Schüttelfrost

Seltene Nebenwirkungen:

- Taubheitsgefühl oder Kribbeln am Körper
- Jucken an der Einstichstelle
- Schwindel
- Durchfall
- juckende rote Flecken, Nesselausschlag

Nebenwirkungen mit nicht bekannter Häufigkeit:

- Allergische Reaktionen
- Schwindel und unsicherer Gang
- steifer Nacken, Nackenschmerzen
- Nervenentzündungen, Gesichtslähmung, Lähmungen
- Hautrötungen und Juckreiz, vermehrtes Schwitzen
- Muskelschwäche und Kribbeln am Körper
- verschwommene Sicht, Augenschmerzen, Lichtempfindlichkeit
- Krampfanfälle mit oder ohne Fieber
- Kurzatmigkeit
- Ohrensausen
- Schüttelfrost und allgemeine Schwäche, Schwellungen
- steife Muskeln und Gelenke, Schmerzen in Armen und Beinen

Wann darf der Impfstoff nicht angewendet werden?

- Wenn bereits bei einer früheren Impfung Reaktionen aufgetreten sind, wie:
 - Hautausschlag,
 - Anschwellen von Gesicht und Hals,
 - Atembeschwerden,
 - Blaufärbung von Zunge und Lippen,
 - Blutdruckabfall und Kollaps

- Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe:
Humanalbumin, Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat,
Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Saccharose, Aluminiumhydroxid,
Neomycin, Gentamycin, Formaldehyd oder Protaminsulfat.
- Wenn Sie an einer schweren Hühnereiweiß-Unverträglichkeit leiden.
- Wenn Sie gerade krank sind und Fieber haben.

Bitte die impfende Ärztin oder den impfenden Arzt unbedingt informieren:

- bei einer Autoimmunerkrankung wie rheumatoider Arthritis oder Multipler Sklerose
- bei Blutungsstörung
- bei schwachem Immunsystem
- bei Einnahme von Medikamenten gegen Krebs
- bei Einnahme von Kortikosteroiden, Kortison und ähnlichen Medikamenten
- bei einer Erkrankung des Gehirns
- bei bekannten Krampfanfällen
- wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie stillen

Nach dieser Information entscheidet die impfende Ärztin oder der impfende Arzt, ob Sie oder Ihr Kind die Impfung bekommen können.

Wenn noch etwas unklar ist, fragen Sie bitte die impfende Ärztin oder den impfenden Arzt.